

山东省 2026 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学I

本试题分为第I卷和第II卷两部分，满分 100 分，考试用时 120 分钟。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项:

1.答题前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷规定的位置上，并将姓名、考生号、座号填(涂)在答题卡规定的位置。

2.第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答在本试卷上无效。

3.第 II 卷必须用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置；如需改动，先划掉原来的答案，再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。

第I卷

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.当 $x \rightarrow 0$ 时，以下函数是无穷小的是（ ）

- A. x^2 B. $\cos x$ C. $\sqrt{1-x}$ D. e^x

2. $x=0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 2+\sin x, & x>0 \\ 3, & x=0 \\ x^2+x+2, & x<0 \end{cases}$ 的（ ）

- A.连续点 B.可去间断点 C.跳跃间断点 D.无穷间断点

3.以下是二阶微分方程的是（ ）

- A. $xy' + y^2 + x^2 = 0$ B. $y = (y')^2 + 2yy' + x^2 = 0$

- C. $(y''')^2 + xy'' - 3y' = 0$ D. $y'' - x^2y' + xy^2 = 0$

4.已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^x(y-1) + \arctan(xy) = 0$ 所确定，则 $y'(0) =$ （ ）

- A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

5.以下级数收敛的是（ ）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\ln n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^2(n+1)}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 5^n}{n!}$

第II卷

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6.已知函数 $f(x) = \frac{x+6}{x+1}$ ，则 $f^{-1}(3) =$ _____.

7.已知两向量 $\vec{a} = (-1, k, 1)$ ，和 $\vec{b} = (1, -2, k)$ 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$ ，则 $k =$ _____.

8.已知函数 $z = \tan(2x + y^2)$ ，则全微分 $dz =$ _____.

9.已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+4)^n$ 在 $x = -7$ 处收敛，在 $x = -1$ 处发散，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(2x-7)^n$ 的收敛域为_____.

10.已知函数 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$ ，则 $\int_1^3 (2x-3)f(x) dx =$ _____.

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11.求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 1} \right)^x$.

12.求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2\cos x - 2}{x^4(1+x)}$.

13.求不定积分 $\int \frac{5x+6}{x^2+3x} dx$.

14.求定积分 $\int_0^{\sqrt{2}} (x^3 + 2x) e^{x^2} dx$.

15.求曲线 $y = x + \ln x$ 通过点 $(0,1)$ 的切线方程.

16. 求平面 $2x+3y+5z+1=0$ 内过点 $(0,-2,1)$ 且垂直于直线 $\frac{x+2}{3}=\frac{y-1}{1}=\frac{z+3}{-2}$ 的直线方程.

17. 求微分方程 $y'+y\sin x=\sin x+e^{\cos x}$ 的通解.

18. 计算二重积分 $\iint_D (x-y)dx dy$, 其中 $D=\{(x,y)|(x-2)^2+(y-2)^2=8, y\geq x\}$.

四、应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

19. 求函数 $f(x,y)=2x^3-12xy+3y^2+6x+6y$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值.

20. 求由曲线 $y=-x^2+2|x|+3$ 与直线 $y=x+3$ 所围成的图形的面积.

五、证明题 (本大题共 1 小题, 每小题 8 分, 共 8 分)

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数, 且 $f(0)=f(1)=1$, 证明: $\forall x\in[0,1]$, 有

$$f(x)\geq 1-\frac{1}{4}\int_0^1|f''(x)|dx.$$



烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2026 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学I

本试题分为第I卷和第II卷两部分，满分 100 分，考试用时 120 分钟。考试结束后，将本试题和答题卡一并交回。

注意事项:

1.答题前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷规定的位置上，并将姓名、考生号、座号填(涂)在答题卡规定的位置。

2.第 I 卷每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答在本试卷上无效。

3.第 II 卷必须用 0.5 毫米黑色签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置；如需改动，先划掉原来的答案，再写上新的答案；不能使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。

第I卷

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.当 $x \rightarrow 0$ 时，以下函数是无穷小的是（ ）

- A. x^2 B. $\cos x$ C. $\sqrt{1-x}$ D. e^x

【答案】A

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, 故选 A

2. $x=0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} 2+\sin x, & x>0 \\ 3, & x=0 \\ x^2+x+2, & x<0 \end{cases}$ 的（ ）

- A.连续点 B.可去间断点 C.跳跃间断点 D.无穷间断点

【答案】B

【解析】

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 \sin x = 2, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + x + 2) = 2, f(0) = 3,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq f(0), \text{ 因此为可去间断点, 故选 B}$$

3.以下是二阶微分方程的是（ ）

A. $xy' + y^2 + x^2 = 0$

B. $y = (y')^2 + 2yy' + x^2 = 0$

C. $(y''')^2 + xy'' - 3y' = 0$

D. $y'' - x^2y' + xy^2 = 0$

【答案】D

4.已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^x(y-1) + \arctan(xy) = 0$ 所确定，则 $y'(0) = ()$

- A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

【答案】C

【解析】将 $x=0$ 带入 $e^x(y-1) + \arctan(xy) = 0$ 可得 $y=1$ ，原式求导为

$$e^x(y-1) + e^x \cdot y' + \frac{y+xy'}{1+x^2y^2} = 0, \text{ 将 } x=0, y=1 \text{ 代入一阶导可得 } y'(0) = -1$$

5.以下级数收敛的是（ ）

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{\ln n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^2(n+1)}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 5^n}{n!}$

【答案】D

【解析】将 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 5^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}$ ，分别用比值判别法判定

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1, \text{ 收敛; } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n+1} = 0 < 1, \text{ 收敛, 收敛加收敛为收敛.}$$

第II卷

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6.已知函数 $f(x) = \frac{x+6}{x+1}$ ，则 $f^{-1}(3) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】令 $y = \frac{x+6}{x+1}$, 则 $x = \frac{6-y}{y-1}$, 即 $f^{-1}(x) = \frac{6-x}{x-1}$, 则 $f^{-1}(3) = \frac{6-3}{3-1} = \frac{3}{2}$

7. 已知两向量 $\vec{a} = (-1, k, 1)$, 和 $\vec{b} = (1, -2, k)$ 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$, 则 $k =$ _____.

【答案】-6

【解析】由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$ 可知 $-1 - 2k + k = 5$, 则 $k = -6$

8. 已知函数 $z = \tan(2x + y^2)$, 则全微分 $dz =$ _____.

【答案】 $dz = 2\sec^2(2x + y^2)dx + 2y\sec^2(2x + y^2)dy$

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2\sec^2(2x + y^2)$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y\sec^2(2x + y^2)$ 则

$$dz = 2\sec^2(2x + y^2)dx + 2y\sec^2(2x + y^2)dy$$

9. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+4)^n$ 在 $x = -7$ 处收敛, 在 $x = -1$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(2x-1)^n$ 的收敛域为 _____.

【答案】 $[-1, 2)$

【解析】 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+4)^n$ 的收敛域是 $[-7, -1)$, $x+4 \in [-3, 3)$, $2x-1 \in [-3, 3)$, $\therefore x \in [-1, 2)$ 即

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(2x-1)^n$ 的收敛域为 $[-1, 2)$.

10. 已知函数 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(t+1)}{t} dt$, 则 $\int_1^3 (2x-3)f(x)dx =$ _____.

【答案】 $10\ln 2 - 5$

【解析】 $f'(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$, $f(1) = 0$

$$\int_1^3 (2x-3)f(x)dx = \int_1^3 f(x)d(x^2-3x) = \left[(x^2-3x)f(x)\right]_1^3 - \int_1^3 (x^2-3x)df(x)$$

$$= -\int_1^3 (x^2-3x) \frac{\ln(x+1)}{x} dx = -\int_1^3 (x-3)\ln(x+1)dx = -\int_1^3 \ln(x+1)d\left(\frac{1}{2}x^2-3x\right)$$

$$= -\left[\ln(x+1)\left(\frac{1}{2}x^2-3x\right)\right]_1^3 + \int_1^3 \left(\frac{1}{2}x^2-3x\right) \frac{1}{x+1} dx = 10\ln 2 - 5$$

三、计算题 (本大题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2x}{x^2+1}\right)^x$.

【解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2+2x}{x^2+1}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x\left(\frac{x^2+2x}{x^2+1}-1\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{x(2x-1)}{x^2+1}} = e^2$

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2\cos x-2}{x^4(1+x)}$.

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2\cos x-2}{x^4(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \cdot \frac{x^2+2\cos x-2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+2\cos x-2}{x^4}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-2\sin x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-\sin x}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{12x} = \frac{1}{12}$

13. 求不定积分 $\int \frac{5x+6}{x^2+3x} dx$.

【解析】 $\int \frac{5x+6}{x^2+3x} dx = \int \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x+3}\right) dx = 2\ln|x| + \ln|x+3| + C$

14. 求定积分 $\int_0^{\sqrt{2}} (x^3+2x)e^{x^2} dx$.

【解析】 $\int_0^{\sqrt{2}} (x^3+2x)e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} (x^2+2)e^{x^2} dx^2$, 令 $t = x^2$ 则

$$\text{原式} = \frac{1}{2} \int_0^2 (t+2)e^t dt = \frac{1}{2} \int_0^2 (t+2)de^t = \frac{1}{2} \left[(t+2)e^t\right]_0^2 - \frac{1}{2} \int_0^2 e^t dt$$

$$= \frac{1}{2} \left[(t+2)e^t\right]_0^2 - \frac{1}{2} \left[e^t\right]_0^2 = \frac{1}{2} (3e^2 - 1)$$

15. 求曲线 $y = x + \ln x$ 通过点 $(0, 1)$ 的切线方程.

【解析】设切点坐标 $(x_0, x_0 + \ln x_0)$, $y' = 1 + \frac{1}{x}$, 则切线斜率为 $k = 1 + \frac{1}{x_0}$, 则切线方程为

$$y - (x_0 + \ln x_0) = \left(1 + \frac{1}{x_0}\right)(x - x_0), \text{ 将 } (0, 1) \text{ 代入求得 } x_0 = e^2, \text{ 所以切线方程为}$$

$$y = \left(1 + \frac{1}{e^2}\right)x + 1$$

16. 求平面 $2x + 3y + 5z + 1 = 0$ 内过点 $(0, -2, 1)$ 且垂直于直线 $\frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+3}{-2}$ 的直线方程.

【解析】设所求平面的方向向量为 $\vec{l}_1$, 由题意得平面的法向量为 $\vec{n} = (2, 3, 5)$, 已知直线方程方向

$$\text{向量为 } \vec{l} = (3, 1, -2), \text{ 则 } \vec{l}_1 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-11, 19, -7), \text{ 直线方程为 } \frac{x}{-11} = \frac{y+2}{19} = \frac{z-1}{-7}$$

17. 求微分方程 $y' + y \sin x = \sin x + e^{\cos x}$ 的通解.

【解析】 $y = e^{-\int \sin x dx} \left[\int (\sin x + e^{\cos x}) e^{\int \sin x dx} dx + C \right] = e^{\cos x} \left[\int (\sin x + e^{\cos x}) e^{-\cos x} dx + C \right]$

$$= e^{\cos x} \left[\int (e^{-\cos x} \sin x + 1) dx + C \right] = e^{\cos x} (e^{-\cos x} + x + C) = 1 + x e^{\cos x} + C e^{\cos x}$$

18. 计算二重积分 $\iint_D (x-y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | (x-2)^2 + (y-2)^2 = 8, y \geq x\}$.

【解析】 $\iint_D (x-y) dx dy = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{4(\sin\theta+\cos\theta)} (r \cos\theta - r \sin\theta) r dr$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{3} r^3 (\cos\theta - \sin\theta) \right]_0^{4(\sin\theta+\cos\theta)} d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{64}{3} (\cos\theta + \sin\theta)^3 (\cos\theta - \sin\theta) d\theta$$

$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{64}{3} (\cos\theta + \sin\theta)^3 d(\cos\theta + \sin\theta) = \frac{64}{3} \frac{1}{4} [(\cos\theta + \sin\theta)^4]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = -\frac{64}{3}$$

四、应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

19. 求函数 $f(x, y) = 2x^3 - 12xy + 3y^2 + 6x + 6y$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值.

【解析】先求一阶偏导 $\begin{cases} f_x = 6x^2 - 12y + 6 \\ f_y = -12x + 6y + 6 \end{cases}$, 令一阶偏导等于零求驻点, 令 $\begin{cases} 6x^2 - 12y + 6 = 0 \\ -12x + 6y + 6 = 0 \end{cases}$

$$\text{解得 } \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x=3 \\ y=5 \end{cases}, \text{ 求二阶偏导 } \begin{cases} f_{xx} = 12x \\ f_{xy} = -12 \\ f_{yy} = 6 \end{cases}$$

$$\text{将 } (1, 1) \text{ 代入二阶偏导计算 } \begin{cases} A = 12 \\ B = -12 \\ C = 6 \end{cases}, \text{ 则 } AC - B^2 = -72 < 0, (1, 1) \text{ 不是极值点}$$

$$\text{将 } (3, 5) \text{ 代入二阶偏导计算 } \begin{cases} A = 36 \\ B = -12 \\ C = 6 \end{cases}, \text{ 则 } AC - B^2 = 72 > 0, \text{ 且 } A > 0 \therefore (3, 5) \text{ 是极小值点,}$$

$$\text{极小值为 } f(3, 5) = -3$$

20. 求由曲线 $y = -x^2 + 2|x| + 3$ 与直线 $y = x + 3$ 所围成的图形的面积.

【解析】二者围城的封闭图形共两部分,

$$\text{面积} = \int_{-3}^0 [(-x^2 - 2x + 3) - (x + 3)] dx + \int_0^1 [(-x^2 + 2x + 3) - (x + 3)] dx$$

$$= \int_{-3}^0 (-x^2 - 3x) dx + \int_0^1 (-x^2 + x) dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-3}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-3}^0 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = \frac{9}{2} + \frac{1}{6} = \frac{14}{3}$$

五、证明题（本大题共1小题，每小题8分，共8分）

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0)=f(1)=1$ ，证明： $\forall x \in [0,1]$ ，有

$$f(x) \geq 1 - \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

证明：

当 $x=0$ 和 $x=1$ 时，不等式恒成立；

当 $x \in (0,1)$ 时，因为二阶可导，所以由拉氏中值定理可得：

$$\exists \xi_1 \in (0, x), \text{ 使得 } f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{f(x) - 1}{x};$$

$$\exists \xi_2 \in (x, 1), \text{ 使得 } f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(x)}{1 - x} = \frac{1 - f(x)}{1 - x};$$

化简不等式（放缩），放缩的思路是要将绝对值拿出来

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(x)| dx &\geq \frac{1}{4} \int_{\xi_1}^{\xi_2} |f''(x)| dx \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f''(x) dx \right| = \frac{1}{4} |f'(\xi_2) - f'(\xi_1)| = \frac{1}{4} \left| \frac{1 - f(x)}{1 - x} - \frac{f(x) - 1}{x} \right| \\ &= \frac{1}{4} |f(x) - 1| \left(\frac{1}{1 - x} + \frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

令 $g(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{x}$ ，求 $x \in (0,1)$ 上的最小值，利用求导的方法， $g'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{1}{x^2}$ ，令

$g'(x) = 0$ ，解得驻点 $x = \frac{1}{2}$ ，是极小值点也是最小值点， $g(x) \geq g\left(\frac{1}{2}\right) = 4$ ，所以

原式 $\geq \frac{1}{4} |f(x) - 1| \times 4 = |f(x) - 1| \geq 1 - f(x)$ ，即 $f(x) \geq 1 - \frac{1}{4} \int_0^1 |f''(x)| dx$ ，得证。

烟台大学统招专升本培训中心

山东省2025年普通高等教育专升本

统一考试

高等数学(一)

本试卷分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。满分100分,考试时间120分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项:

- 1.答题前,考生务必用0.5毫米黑签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷规定的位置上,并将姓名、考生号、座号填(涂)在答题卡规定的位置。
- 2.第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B笔把答题卡上对应题目的答标号涂黑如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答在本试卷上无效。
- 3.第Ⅱ卷答题必须用0.5毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第Ⅰ卷

一、单项选择题(本大题共5小题,每题3分,共15分)

1.下列函数是周期函数的是()

A x^2 B e^x C $\cos x$ D $\ln(1+x^2)$

2.已知函数 $y = \frac{x+3}{2x-4}$,则函数的水平渐近线为()

A $y = \frac{1}{2}$ B $y = -\frac{1}{2}$ C $y = 2$ D $y = -3$

3.曲线方程 $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = t^3 + e^t \end{cases}$,则曲线在 $t=0$ 处的切线斜率为()

A $-\frac{1}{2}$ B $\frac{1}{2}$ C -2 D 2

4.微分方程 $y'' - 6y' + 34y = 0$ 的通解为()

A $y = e^{5x}(c_1 \sin 3x + c_2 \cos 5x)$ B $y = e^{3x}(c_1 \sin 5x + c_2 \cos 5x)$

C $y = e^{5x}(c_1 \sin 3x + c_2 \cos 3x)$ D $y = e^{3x}(c_1 \sin 5x + c_2 \cos 3x)$

5.已知 $z = \arcsin(x-2y)$,则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ()

A $\frac{-2(x-2y)}{[1-(x-2y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ B $\frac{2(x-2y)}{[1-(x-2y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ C $\frac{-(x-2y)}{[1-(x-2y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ D $\frac{(x-2y)}{[1-(x-2y)^2]^{\frac{3}{2}}}$

第Ⅱ卷

二、填空题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

6.已知 $f(x) = \begin{cases} x^2+3, & x \leq 1 \\ 2^{x-1}, & x > 1 \end{cases}$,则 $f[f(0)] =$ _____

7.已知向量 $\vec{a} = (3, k, -1)$,向量 $\vec{b} = (2, 1, 3k)$ 且两向量垂直,则 $k =$ _____

8.已知 $f(x)$ 在 R 上连续且 $\int_1^2 f(2x)dx = 1$,则 $\int_2^4 f(x)dx =$ _____

9.已知 $z = x^2 e^y$,则全微分 $dz =$ _____

10.已知 $f(x)$ 在 R 上有连续导数,积分 $I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} f(x, y)dx + \int_1^2 dy \int_0^{1-\sqrt{y-1}} f(x, y)dx$,则交换积分次序后得 $I =$ _____

三、计算题(本大题共8小题,每小题6分,共48分)

11.求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x^2+x-3}-x}$

12.求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 3 \ln(1+x)}{1+x-\cos 2x}$

13.求不定积分 $\int (\frac{1}{x^2} + x \cos x)dx$

14.求定积分 $\int_0^2 \ln(2+\sqrt{x})dx$

15.求过点 $(2, -1, 1)$ 且平行于直线 $\begin{cases} 3x-y+2z+1=0 \\ x-2y+3z+5=0 \end{cases}$ 的直线方程

16 求微分方程 $e^y y' = x^2(5 + e^y)$ 的通解

17 已知幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-5)^n}{(\sqrt{n+1})3^n}$, 求收敛域

18 计算二重积分 $\iint_D x dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = |x^2 - 4|$ 和直线 $y = 3x$ 所围成的闭区域

四、应用题 (本大题共2小题, 每小题7分, 共14分)

19 设平面图形 D 是由曲线 $y = e^x$, $y = \sqrt{2x - x^2}$ 和直线 $x = 0, x = 1$ 所围成的封闭区域,

求 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积

20 求函数 $f(x) = x + \ln(1 + x^2) - 4 \arctan x$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值

五、证明题 (本大题共1小题, 每小题8分, 共8分)

21 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 在 $(0, 1)$ 可导

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 f(x) dx = f(0) + f'(\xi)(1 - \xi)$



高等数学（一）答案

一、选择

1 C 2 A 3 D 4 B 5 B

二、填空题

6 4 7 $k=3$ 8 2 9 $dz=2xe^y dx+x^2e^y dy$ 10 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2-2x+2} f(x,y) dy$

三、计算题

11 6

12 4

13 $-\frac{1}{x} + x \sin x + \cos x + c$

14 $4 \ln 2 + 2$

15 $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-7} = \frac{z-1}{5}$

16 $y = \ln(ce^{\frac{x^3}{3}} - 5)$

17 $[2, 8)$


18 $\frac{99}{4}$

19 $\pi(\frac{e^2}{2} - \frac{7}{6})$

20 极小值 $f(-1) = \pi - 1 - \ln 2$

极大值 $f(3) =$

21 得证



山东省 2024 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学 (I) 真题试卷

一、选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、下列函数是偶函数的是 ()

A. $y = \tan x$

B. $y = \cos x$

C. $y = x^3$

D. $y = 3^x$

2、若函数 $f(x) = \begin{cases} 4x+5, & x < 1 \\ 2-x^2, & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $x=1$ 是函数的 ()

A. 连续点

B. 可去间断点

C. 跳跃间断点

D. 无穷间断点

3、函数 $y = x^2(2\ln x - 5)$ 的拐点是 ()

A. (e^2, e^4)

B. $(e^2, -e^4)$

C. $(e, 3e^2)$

D. $(e, -3e^2)$

4、函数 $z = \arctan(x^2y)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分为 ()

A. $dx + \frac{1}{2}dy$

B. $\frac{1}{2}dx + \frac{1}{2}dy$

C. $\frac{1}{2}dx + dy$

D. $2dx + dy$

5、下列级数绝对收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n+3}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n+1}{n^n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{1+\ln^3 n}$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \sin \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} =$.

7、若两向量分别为 $\vec{a} = (3, 0, 4)$, $\vec{b} = (2, 2, 1)$, 则两向量的夹角余弦为_____.

8、若微分方程 $16y'' - 8y' + y = 0$, 则通解为_____.

9、已知无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{(2n+1)3^n}$ ，则收敛半径为_____.

10、已知函数 $f(x)$ 在 R 上具有连续的导数，且满足 $f(0) = f(1)$ ， $\int_0^1 t f(x-t) dt = 2x+1$ ，
则 $\int_0^1 x f'(x) dx =$ _____.

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11、求极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} - \frac{9}{x^2-3x} \right)$.

12.求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} + x - 2}{1 - x - \ln x}$.

13、已知函数 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{x-y} + x^2 - y = 1$ 确定的隐函数，求该函数在点 (1,1) 处的切线方程.

14、求不定积分 $\int \frac{x^2 + 5x + 2}{x^2 + 4} dx$.

15、求定积分 $\int_0^1 x e^{\sqrt{1-x^2}} dx$.

16、已知平面 π 过点 $(1, 0, 2)$ ，且与直线 $\begin{cases} x - y + z + 2 = 0 \\ x - 3y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 垂直，求原点到平面的距离.

烟台大学统招专升本培训中心

17、求微分方程 $xdy - (1 + y^2)\ln x dx = 0$ 的通解.

18、计算二重积分 $\iint_D (x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$, 直线 $y = x$, $x = 1$ 所围成的封闭区域。

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

19、求由曲线 $y = \begin{cases} 3x, & x < 0 \\ x^2 - 2x, & x \geq 0 \end{cases}$ 与 $y = -x^2 + 4$ 所围成的封闭图形的面积.

20、求函数 $f(x, y) = x^2 - 4xy + 2y^2 + 2y^3$ 的极值，并判断是极大值还是极小值.

五、证明题（本大题共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

21、已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，在 $(0, 1)$ 内存在最大值 $M > 0$ ，且满足 $f(0) = f(1) = 0$ ，证明：存在一点 $\xi, \eta \in (0, 1)$ ，使得 $|f'(\xi)| + |f'(\eta)| \geq 4M$ 成立.

烟台大学统招专升本培训中心

2024 山东专升本-数学 1 参考答案

一、单项选（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1.B 2.C 3.D 4.A 5.C

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6. $e^{\frac{1}{2}}$ 7. $\frac{2}{3}$ 8. $y = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{x}{4}}$ 9. 3 10. -2

三、计算（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11. 解: $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x}{x-3} - \frac{9}{x^2-3x} \right) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x^2-3x} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x} = 2$

12. 解: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} + x - 2}{1 - x - \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} + 1}{-1 - \frac{1}{x}} = -1.$

13. 解: 方程两边对 x 求导, 得 $e^{x-y}(1-y') + 2x - y' = 0.$

则 $y'|_{x=1} = \frac{3}{2}$. 即切线的斜率 $k = \frac{3}{2}$.

所以切线方程为 $y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$

14. 解: $\int \frac{x^2 + 5x + 2}{x^2 + 4} dx$

$$= \int \left(1 + \frac{5x}{x^2 + 4} - \frac{2}{x^2 + 4} \right) dx$$

$$= x + \frac{5}{2} \ln(x^2 + 4) - \arctan \frac{x}{2} + C.$$

15. 解: 令 $\sqrt{1-x^2} = t.$

$$\int_0^1 x e^{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^1 t e^t dt = t e^t \Big|_0^1 - \int_0^1 e^t dt = 1.$$

16. 解: 由题意, 平面 Π 的法向量为 $n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = (1, -1, -2).$

所求平面 Π 的方程为 $x - y - 2z + 3 = 0.$

原点到平面几的距离 $d = \frac{3}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

17.解: 分离变量得 $\frac{1}{1+y^2} dy = \frac{\ln x}{x} dx$.

两边积分得 $\arctan y = \frac{1}{2} \ln^2 x + C$.

18.解: 今 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$,

则 D 在极坐标系下为: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 1 \leq r \leq \frac{1}{\cos \theta}$.

$$\iint_D (x^2 + y^2)^{-\frac{5}{2}} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_1^{\frac{1}{\cos \theta}} r^{-4} dr = -\frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^3 \theta - 1) d\theta = \frac{\pi}{12} - \frac{5\sqrt{2}}{36}$$

四、应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

19.解: 曲线 $y = -x^2 + 4$ 与 $y = 3x (x \leq 0)$ 的交点为 $(-4, -12)$.

曲线 $y = -x^2 + 4$ 与 $y = x^2 - 2x (x > 0)$ 的交点为 $(2, 0)$,

则所求面积为

$$S = \int_{-4}^0 [(-x^2 + 4) - 3x] dx + \int_0^2 [(-x^2 + 4) - (x^2 - 2x)] dx = \frac{76}{3}$$

20.解: 由得驻点为

$$\begin{cases} f_x = 2x - 4y = 0, \\ f_y = -4x + 4y + 6y^2 = 0 \end{cases} \text{得驻点 } (0, 0) \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3} \right).$$

$$f_{xx} = 2, f_{xy} = -4, f_{yy} = 4 + 12y$$

烟台大学统招专升本培训中心

在点 $(0, 0)$ 处, $AC - B^2 = -8 < 0$, 所以 $(0, 0)$ 不是极值点:

在点 $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3} \right)$ 处, $AC - B^2 = 8 > 0$, 又 $A > 0$

所以 $\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3} \right)$ 为极小值点, 极小值为 $f\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3} \right) = -\frac{8}{27}$.

五、证明题 (本大题共 1 小题, 共 8 分)

21.证明: 因 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 由最值定理,

存在点 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) = M$.

因 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 在 $(0, x_0)$ 内可导, 又 $f(0) = 0$,

由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x_0)$, 使得

$$f(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{f(x_0)}{x_0}.$$

同理, 在 $[x_0, 1]$ 上对函数 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 且 $f(1) = 0$ 得

$$\text{存在 } \eta \in (x_0, 1), \text{ 使得 } f(\eta) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{-f(x_0)}{1 - x_0},$$

$$\text{从而 } |f(\xi)| + |f'(\eta)| = \left(\frac{1}{x_0} + \frac{1}{1 - x_0} \right) M$$

$$\text{又 } 0 < x_0(1 - x_0) \leq \frac{1}{4}, \text{ 则 } \frac{1}{x_0} + \frac{1}{1 - x_0} = \frac{1}{x_0(1 - x_0)} \geq 4$$

$$\text{所以 } |f(\xi)| + |f'(\eta)| \geq 4M.$$

烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2023 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学 (I)

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $y = \ln(3x-1)$ 的定义域为

A. $(\frac{1}{3}, +\infty)$

B. $(-\infty, \frac{1}{3})$

C. $[\frac{1}{3}, +\infty)$

D. $(-\infty, \frac{1}{3}]$

2. 下面属于三阶微分方程的是

A. $x^2 y'' - xy' + y = 0$

B. $x(y')^3 - 2yy' + x = 0$

C. $y''' - 3y'' = 0$

D. $x^2 dy + y^3 dx = 0$

3. $x \rightarrow 0$ 时以下不是无穷小量的是

A. $\tan x$

B. $\sin 2x$

C. $\ln(1+x)$

D. $e^x + 1$

4. 已知 $f(x)$ 在 $x=3$ 处可导, 且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3-2\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = 4$, 则 $f'(3) =$

A. 2

B. -2

C. 4

D. -4

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则下列收敛的是

A.

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + \frac{1}{n})$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + \frac{1}{n^2})$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{5}{x}} =$ _____

7. 已知 $\vec{a} = (-2, 1, k)$, $\vec{b} = (4, 5, 1)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $k =$ _____

8. 已知参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 2t \\ y = \arcsin t \end{cases}$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{t=0} =$ _____

9. 已知 $\int_0^{2x} f(t)dt = x^3 + x^2$, 则 $f(4) =$ _____

10. 二重积分 $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{-x^2+2x+4} f(x,y)dy + \int_0^1 dx \int_{5x}^{-x^2+2x+4} f(x,y)dy$ 交换积分次序后为 _____

三、解答题 (本大题共 8 个小题, 每小题 6 分, 共 48 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\cos x} - \cos x}{x^2}$

13. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^2 + 10x + 26} dx$

14. 求过点 $A(1,0,-4), B(3,1,-2)$ 且与直线 $\frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ 平行的平面方程

15. 求二元函数 $z = \sqrt{y^2+1} + \ln(x-y)$ 的全微分

16. 求微分方程 $x^2 y' + xy = x^2 + \ln x$ 满足初始条件 $y|_{x=1} = \frac{1}{2}$ 的特解

17. 计算二重积分 $\iint_D \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 0 \leq y \leq \sqrt{3}x, 1 \leq x^2+y^2 \leq 4\}$

18. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!}$ 的收敛域与和函数

四、应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

19. 求由直线 $x+y=2$, 曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 y 轴围成图形绕 x 轴旋转一周而围成旋转体的体积

20. 求函数 $f(x) = (2x-3)e^x - x^2 + x$ 的极值

五、证明题 (本大题共 1 道小题, 每小题 8 分, 共 8 分)

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1$

证明: (1) 对于任意整数 $n \geq 2$, 存在 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $\int_0^{x_0} f(x) dx = \frac{1}{n}$

(2) 在 $(0,1)$ 内存在两个不同的点 ξ, η , 使得 $f(\eta) + 3f(\xi) = 4f(\xi)f(\eta)$

烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2023 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学 I 试题参考答案

第 I 卷

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. C $3x - 1 > 0$, 解得 $x > \frac{1}{3}$, 所以定义域为 $(\frac{1}{3}, +\infty)$

2. C 微分方程的阶数等于方程中所包含未知函数的最高阶数的阶数,

C 选项的微分方程中最高阶导数为三阶导数, 所以该微分方程为三阶微分方程.

3. D 极限为零的量称为无穷小量, $\lim_{x \rightarrow 0}(e^x + 1) = 2$.

4. B $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - 2\Delta x) - f(3)}{\Delta x} = -2 \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3 - 2\Delta x) - f(3)}{-2\Delta x} = -2f'(3) = 4$
所以 $f'(3) = -2$

5. D 收敛 + 收敛 = 收敛; 当 $u_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 时, A、B、C 三个选项均发散.

第 II 卷

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. e^5 利用第二重要极限可知 $\lim_{x \rightarrow 0}(1+x)^{\frac{5}{x}} = e^5$

7. 3 由题意可知 $(-2, 1, k) \cdot (4, 5, 1) = -8 + 5 + k = 0$, 解得 $k = 3$.

8. $\frac{1}{2}$ $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}}{3t^2+2} = \frac{1}{(3t^2+2)\sqrt{1-t^2}}$, 则 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{t=0} = \frac{1}{2}$

9. 8 两边同时对 x 求导得 $2f(2x) = 3x^2 + 2x$, 令 $x = 2$ 得 $2f(4) = 16$ 所以 $f(4) = 8$.

10. $I = \int_0^1 dy \int_{-y}^{\frac{y}{5}} f(x, y) dx + \int_1^5 dy \int_{1-\sqrt{5-y}}^{\frac{y}{5}} f(x, y) dx$
 $\begin{cases} y = 5x \\ y = -x^2 + 2x + 4 \end{cases}$ 交点坐标为 $(1, 5)$, $\begin{cases} y = -x \\ y = -x^2 + 2x + 4 \end{cases}$ 交点坐标为 $(-1, 1)$

故交换积分次序后

$$I = \int_0^1 dy \int_{-y}^{\frac{y}{5}} f(x, y) dx + \int_1^5 dy \int_{1-\sqrt{5-y}}^{\frac{y}{5}} f(x, y) dx$$

三、计算题 (本大题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分)

$$11. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 3x} - x) \cdot (\sqrt{x^2 + 3x} + x)}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{(\sqrt{x^2 + 3x} + x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1} = \frac{3}{2}$$

$$12. \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\cos x} \cdot \sin x + \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (e^{1-\cos x} + 1)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{1-\cos x} + 1}{2} = 1$$

$$13. \int \frac{dx}{x^2 + 10x + 26} = \int \frac{1}{(x+5)^2 + 1} d(x+5) = \arctan(x+5) + C$$

14. 由题意可知 $\overrightarrow{AB} = (2, 1, 2)$, 因为所求平面过点 A 、 B 且与已知直线垂直

所以所求平面的法向量 $\vec{n} \perp \overrightarrow{AB}, \vec{n} \perp \vec{s}$, 故可取

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \vec{s} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (4, 2, -5), \text{又平面过点 } A(1, 0, -4)$$

所以平面方程为 $4(x-1) + 2(y-0) - 5(z+4) = 0$, 即 $4x + 2y - 5z - 24 = 0$

$$15. \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x-y}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{2\sqrt{y^2+1}} - \frac{1}{x-y} = \frac{y}{\sqrt{y^2+1}} - \frac{1}{x-y}$$

$$\text{所以 } dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{1}{x-y} dx + \left(\frac{y}{\sqrt{y^2+1}} - \frac{1}{x-y} \right) dy$$

$$16. \text{微分方程整理得 } y' + \frac{1}{x}y = 1 + \frac{\ln x}{x^2}, \text{其中 } p(x) = \frac{1}{x}, q(x) = 1 + \frac{\ln x}{x^2}$$
$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right] = e^{-\int \frac{1}{x}dx} \left[\int \left(1 + \frac{\ln x}{x^2} \right) e^{\int \frac{1}{x}dx} dx + C \right]$$
$$= \frac{1}{x} \left[\int \left(1 + \frac{\ln x}{x^2} \right) \cdot x dx + C \right] = \frac{1}{x} \left[\int \left(x + \frac{\ln x}{x} \right) dx + C \right] = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\ln^2 x + C \right)$$

$$= \frac{1}{2}x + \frac{\ln^2 x}{2x} + \frac{C}{x}$$

又 $y|_{x=1} = \frac{1}{2}$, 代入通解得 $C = 0$, 所以该微分方程的特解为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{\ln^2 x}{2x}$

17. 设 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$, 则 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, 1 \leq r \leq 2$

$$\iint_D \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^2 \frac{r^2 \sin\theta \cos\theta}{r} \cdot r dr = \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_1^2 r^2 \sin\theta \cos\theta dr$$

$$= \frac{7}{3} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{7}{3} \cdot \frac{1}{2} \sin^2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{7}{8}$$

$$18. \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+2)n!}{(n+3)(n+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+2}{(n+3)(n+1)} \right| = 0$$

所以 $R = \infty$, 收敛域为 $(-\infty, +\infty)$

$$\text{设 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!}$$

$$S'(x) = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{(n+2)n!} \right]' = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{x^{n+2}}{(n+2)n!} \right]' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = x e^x$$

所以和函数为 $S(x) = \int_0^x x e^x dx = x e^x \Big|_0^x - e^x \Big|_0^x = x e^x - e^x + 1, x \in (-\infty, +\infty)$

四、应用题 (本大题共 2 题, 每小题 7 分, 共 14 分)

$$19. V_x = \pi \int_0^1 (2-x)^2 dx - \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^1 (4-4x+x^2) dx - \pi \int_0^1 x dx$$

$$= \pi \left(4x - 2x^2 + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 - \pi \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = \frac{11}{6} \pi$$

20. 函数的定义域为 $\mathbf{R}$,

$$f'(x) = 2e^x + (2x-3)e^x - 2x + 1 = e^x(2x-1) - (2x-1) = (2x-1)(e^x - 1)$$

$$\text{令 } f'(x) = 0 \text{ 得 } x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 0, f''(x) = 2(e^x - 1) + (2x-1)e^x = 2xe^x + e^x - 2$$

$$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 2e^{\frac{1}{2}} - 2 = 2\left(e^{\frac{1}{2}} - 1\right) > 0, f''(0) = 1 - 2 < 0$$

所以 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得极小值, 且极小值为 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - 2\sqrt{e}$

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值, 且极大值为 $f(0) = -3$

五、证明题 (本大题共 1 小题, 每小题 8 分, 共 8 分)

21. (1) 令 $F(x) = \int_0^x f(x) dx - \frac{1}{n}$, 显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续

$$F(0) = -\frac{1}{n} < 0, F(1) = \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} > 0, \text{ 即 } F(0) \cdot F(1) < 0$$

由零点定理知, 对于任意 $n \geq 2$, 至少存在 $x_0 \in (0, 1)$,

$$\text{使得 } F(x_0) = 0, \text{ 即 } \int_0^{x_0} f(x) dx = \frac{1}{n}$$

(2) 令 $G(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{1}{4}$, 由 (1) 可知 $G(x_0) = 0$,

显然 $G(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 在 $(0, x_0)$ 内可导, 由拉格朗日中值定理知,

存在 $\eta \in (0, x_0)$, 使得

$$G'(\eta) = \frac{G(x_0) - G(0)}{x_0} = \frac{0 - \left(0 - \frac{1}{4}\right)}{x_0} = \frac{\frac{1}{4}}{x_0} = f(\eta)$$

同理存在 $\xi \in (x_0, 1)$, 使

$$\text{得 } G'(\xi) = \frac{G(1) - G(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1 - \frac{1}{4} - 0}{1 - x_0} = \frac{\frac{3}{4}}{1 - x_0} = f(\xi)$$

$$4f(\xi)f(\eta) = 4 \cdot \frac{3}{4(1-x_0)} \cdot \frac{1}{4x_0} = \frac{3}{4x_0(1-x_0)}$$

$$f(\xi) + 3f(\eta) = \frac{3}{4(1-x_0)} + \frac{3}{4x_0} = \frac{3}{4x_0(1-x_0)}$$

综上所述可知 $\exists \xi, \eta \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + 3f(\eta) = 4f(\xi)f(\eta)$.

山东省 2022 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学 (I) 试题

本试卷共 3 页, 满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项:

1. 答卷前, 考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定的位置, 并在答题卡指定位置中粘贴考生条形码。

2. 作答选择题时, 选出每小题答案后, 须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑; 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。作答非选择题时, 须用 0.5 毫米黑伊签字笔将答案写在答题卡各题目指定区域内相应的位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后, 将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ b - \cos x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则实数 a 和 b 的值是

A. $a=1, b=2$

B. $a=1, b=-2$

C. $a=-1, b=2$

D. $a=-1, b=-2$

2. 以下向量与 $\vec{a} = (2, -3, 1)$ 垂直的是

A. $(-2, 3, -1)$

B. $(3, 0, 2)$

C. $(3, 2, 1)$

D. $(3, 2, 0)$

3. 以下微分方程的通解为 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{4x}$ (C_1, C_2 为任意常数) 的是

A. $y'' - 2y' - 8y = 0$

B. $y'' + 2y' - 8y = 0$

C. $y'' - 6y' + 8y = 0$

D. $y'' + 6y' + 8y = 0$

4. 下列级数发散的是

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n})$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$

5. 函数 $f(x, y)$ 在 R^2 上连续, 将 $I = \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{3}x} f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_0^{\sqrt{16-x^2}} f(x, y) dy$ 的极坐标形式为

A. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^4 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^4 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^4 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^4 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{3x})^{kx} = e^2$, 则 $k =$ _____.

7. 设点 $(1, a)$ 是曲线 $y = ax^3 - x^2 - 2x + 3$ 的拐点, 则 $a =$ _____.

8. 已知两点 $A(-2, 1, -1), B(2, 5, 1)$, 则 $|\overrightarrow{AB}| =$ _____.

9. 当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时, 函数 $f(x) = \frac{1}{1-2x}$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式为 _____.

10. 已知函数 $f(x)$ 在 R 上连续, 且 $\int_0^{1-2x} f(t) dt = x^2$, 则 $f(x) =$ _____.

三、解答题 (本大题共 7 小题, 每小题 6 分, 共 42 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{2x-3}-1}$

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos 3x}{3x^2}$.

13. 求不定积分 $\int (2x \ln x + \sin x) dx$.

14. 求过点 $(0, 2, 3)$ 且过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{1} = \frac{z+1}{3}$ 和 $\begin{cases} x=3+t \\ y=2+2t \\ z=1+t \end{cases}$ 都平行的平面方程.

15. 求微分方程 $2\sqrt{xy}' = y^2 + 1$ 的通解.

16. 已知 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\sin(xz) = yz$ 确定的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

17. 计算二重积分 $\iint_D xy^3 dx dy$, 其中 D 是由曲线 $y = x, y = \frac{x}{2}, y = 1$ 围成的闭区域.

四、应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

18. 求函数 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 5x^2 + 12x - \frac{1}{3}$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值.

19. 过点 $(-1, 1)$ 作曲线 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ 的法线, 求其与该曲线围成的图形的面积.

烟台大学统招专升本培训中心


五、证明题 (本大题共 2 个小题, 第 20 小题 6 分, 第 21 题 8 分, 共 14 分)

20. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x + \frac{x^2}{2} > (1+x)\ln(1+x)$

21. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上连续, 在 $(1, 3)$ 内可导, 且 $f(1) = f(2) = 1, f(3) = 0$.

证明 (1) 存在 $\xi \in (2, 3)$ 使得 $f(\xi) = \frac{1}{\xi}$;

(2) 存在 $\eta \in (2, 3)$, 使得 $\eta^2 f'(\eta) + 1 = 0$.



烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2022 年普通高等教育专升本统一考试 高等数学 (I) 试题答案解析

一、单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. (A)

解: 因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$,
而 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + a) = a$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (b - \cos x) = b - 1$, $f(0) = 1$, 即
 $a = b - 1 = 1$, 所有 $a = 1, b = 2$, 答案选 A

2. (D)

解: 两个向量垂直的充要条件为数量积为 0, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. 已知向量 $\vec{a} = (2, -3, 1)$, 设题
目四个选项的向量为 $\vec{b}$, D 选项中 $\vec{b} = (3, 2, 0)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 3 + (-3) \times 2 + 1 \times 0 = 0$, 因此
 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 而 A、B、C 选项中都有 $\vec{a} \cdot \vec{b} \neq 0$, 因此答案选 D

3. (A)

解: 二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的特征方程为 $r^2 + pr + q = 0$, 根据通解公式可知特
征方程的解为 $r_1 = -2, r_2 = 4$, 因此原方程可写为 $(r+2)(r-4) = 0$, 整理得 $r^2 - 2r - 8 = 0$,
因此原微分方程为 $y'' - 2y' - 8y = 0$, 答案选 A.

4. (B)

解: A 选项中根据正项级数比值法可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, 因为 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 所以原级数收敛.

B 选项中根据正项级数比值法可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1$, 因为 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以原级数发散. C

选项为交错级数, 根据莱布尼兹判别法 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, 因此原级数收敛. D 选

项为几何级数, $\left|\frac{1}{3}\right| < 1$ 因此收敛. 答案选 B

5. (B)


解: 由题意可知积分区域为 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ 0 \leq y \leq \sqrt{3}x \end{cases}$,

$\begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq \sqrt{16-x^2} \end{cases}$,

图形如图所示, 化为极坐标为 $\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \\ 0 \leq \rho \leq 4 \end{cases}$,

因此原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^4 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$,

答案选 B



二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 6

解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{kx} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{3x \cdot \frac{k}{3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3x}\right)^{3x}\right]^{\frac{k}{3}} = e^{\frac{k}{3}} = e^2$, 即 $\frac{k}{3} = 2$, 因此 $k = 6$.

7. $\frac{1}{3}$

解: 由题意可知, $y' = 3ax^2 - 2x - 2$, $y'' = 6ax - 2$, 根据拐点处二阶导数为零, 因此

$$y''(1) = 0, \text{ 即 } 6a - 2 = 0, \text{ 所以 } a = \frac{1}{3}.$$

8.6

解: 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 为终点 B 的坐标减去 A 的坐标, 因此 $\overrightarrow{AB} = (4, 4, 2)$, 进一步由

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{4^2 + 4^2 + 2^2} = 6.$$

$$9. \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$$

解: 根据麦克劳林公式 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ 得, $f(x) = \frac{1}{1-2x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (2x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

$$10. \frac{x-1}{2}$$

解: 等式两边同时求导得 $\left(\int_0^{1-2x} f(t)dt\right)' = (x^2)'$, 计算得 $f(1-2x)(1-2x)' = 2x$, 整理得

$$f(1-2x) = -x, \text{ 令 } 1-2x = t, \text{ 则 } x = \frac{1-t}{2}, \text{ 代入函数得 } f(t) = \frac{t-1}{2}, \text{ 因此 } f(x) = \frac{x-1}{2}$$

三、解答题 (本大题共 8 小题, 每小题 7 分, 共 56 分)

$$11. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{2x-3}-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{2x-3}+1)}{2x-3-1} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{2x-3}+1)}{2(x-2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3}+1}{2}$$

$$= 1$$

$$12. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 3x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin 3x}{6x} = \frac{3}{2}$$

$$\text{或者 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos 3x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(3x)^2}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x^2}{2 \cdot 3x^2} = \frac{3}{2}$$

$$13. \text{解: } \int (2x \ln x + \sin x) dx$$

$$= \int \ln x d(x^2) + \int \sin x dx$$

$$= x^2 \ln x - \int x^2 d(\ln x) + \int \sin x dx$$

$$= x^2 \ln x - \int x dx - \cos x$$

$$= x^2 \ln x - \frac{1}{2}x^2 - \cos x + C$$

14. 解: 由题意, 两直线的方向向量分别为 $\vec{s}_1 = (2, 1, 3)$, $\vec{s}_2 = (1, 2, 1)$, 则所求平面的法向量为

$$\vec{n} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -5\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}, \text{ 所求平面的点法式方程为}$$

$$-5(x-0) + (y-2) + 3(z-3) = 0, \text{ 即 } 5x - y - 3z + 11 = 0$$

$$15. \text{解: 分离变量得 } \frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{2\sqrt{x}},$$

$$\text{两端积分 } \int \frac{dy}{1+y^2} = \int \frac{dx}{2\sqrt{x}},$$

$$\text{得通解 } \arctan y = \sqrt{x} + C$$

16. 解: (解法一) 令 $F(x, y, z) = \sin(xz) - yz$, 则

$$F_x = z \cos(xz), F_y = -z, F_z = x \cos(xz) - y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{z \cos(xz)}{x \cos(xz) - y},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{z}{x \cos(xz) - y}$$

(解法二)

$$\text{两边关于 } x \text{ 同时求导 } \left(z + x \frac{\partial z}{\partial x} \right) \cos(xz) = y \frac{\partial z}{\partial x},$$


$$\text{整理可得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z \cos(xz)}{y - x \cos(xz)}.$$

$$\text{两边关于 } y \text{ 同时求导 } x \frac{\partial z}{\partial y} \cos(xz) = z + y \frac{\partial z}{\partial y},$$

$$\text{整理可得 } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{x \cos(xz) - y}.$$

17.解: 积分区域如图

$$\begin{aligned} \iint_D xy^3 dx dy &= \int_0^1 dy \int_y^{2y} xy^3 dx \\ &= \int_0^1 y^3 \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_y^{2y} dy \\ &= \frac{3}{2} \int_0^1 y^5 dy \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$



四、计算题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

18.解: (解法一) 定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x) = 2x^2 - 10x + 12 = 2(x-2)(x+3)$, 令 $f'(x) = 0$,

解得 $x_1 = 2, x_2 = 3$

x	$(-\infty, 2)$	2	$(2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↑	极大值	↓	极小值	↑

故 $f(x)$ 在 $x=2$ 取极大值 $f(2)=9$, $f(x)$ 在 $x=3$ 取极小值 $f(3)=\frac{26}{3}$

(解法二) $f''(x) = 4x - 10$, 又 $f''(2) = -8 < 0$, 在 $x=2$ 取极大值 $f(2)=9$;

又 $f''(3) = 2 > 0$, 在 $x=3$ 取极小值 $f(3)=\frac{26}{3}$;


19.解: $y'(x) = x$, 点 $(-1, 1)$ 处法线斜率 $k=1$,

所以, 过点 $(-1, 1)$ 的法线方程为 $y = x + 2$,

该法线与抛物线的另一个交点为 $(3, 5)$, 因此围成的图

形的面积

$$S = \int_{-1}^3 \left(x + 2 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2} \right) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_{-1}^3 = \frac{16}{3}$$



五、证明题 (本大题共 2 个小题, 第 20 小题 6 分, 第 21 题 8 分, 共 14 分)

20.证明: 令 $f(x) = 2x + \frac{x^2}{2} - (1+x)\ln(1+x)$,

$$f'(x) = x - \ln(1+x), f''(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x},$$

当 $x > 0$ 时 $f''(x) > 0$, 所以当 $x > 0$ 时 $f'(x)$ 单调递增,

因此, $f'(x) > f'(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 单调递增,

从而, $f(x) > f(0) = 0$,

$$\text{即 } 2x + \frac{x^2}{2} > (1+x)\ln(1+x)$$

21.证明: (1) 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{x}$

由已知, $F(x)$ 在 $[2, 3]$ 上连续, 且有

$$F(2) = f(2) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, F(3) = f(3) - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} < 0,$$

由零点定理知: $\xi \in (2, 3)$, 使得 $F(\xi) = 0$

$$\text{即 } f(\xi) = \frac{1}{\xi}$$

(2) 由已知, $F(x)$ 在 $[1, \xi]$ 上连续, $(1, \xi)$ 内可导, 且有 $F'(x) = f'(x) + \frac{1}{x^2}$

$$\text{令 } F(1) = f(1) - 1 = 0, F(\xi) = f(\xi) - \frac{1}{\xi} = 0$$

由罗尔定理得: $\eta \in (1, \xi) \subset (1, 3)$, 使得

$$F'(\eta) = 0 \text{ 即 } f'(\eta) + \frac{1}{\eta^2} = 0, \text{ 化简 } \eta^2 f'(\eta) + 1 = 0$$



烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2021 年普通高等教育专升本统一考试

高等数学 (I) 试题

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分,共 3 页。满分 100 分。考试用时 120 分钟。考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

注意事项:

1. 答题前,考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷规定的位置上,并将姓名、考生号、座号填(涂)在答题卡规定的位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答在本试卷上无效。
3. 第 II 卷答题必须用 0.5 毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题 (每题 3 分,共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将答题卡的相应代
码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 已知函数 $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$, 则 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的 ()。

- (A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 无穷间断点 (D) 连续点

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2, & x \leq 0 \\ \sin x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的 ()。

- (A) 左、右导数都存在且相等 (B) 左导数存在,右导数不存在

(C) 左导数不存在,右导数存在

(D) 左、右导数都存在但不相等

3. 以下是二阶微分方程的是 ()。

(A) $(y')^2 - 3y = 0$

(B) $(y'')^2 + x^2 y' = 0$

(C) $yy' + x^2 = 0$

(D) $y''' + x^2 y'' = 0$

4. 以下级数条件收敛的是 ()。

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{2}\right)^n$

5. 已知函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^{4\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = ()$ 。

(A) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$

(B) $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$

(C) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}} f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} f(x, y) dy$

(D) $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} f(x, y) dy$

第 II 卷

二、填空题 (每题 3 分,共 15 分)

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & |x| > 1 \\ x, & |x| \leq 1 \end{cases}$, 则 $f[f(2021)] =$ _____。

2. 点 $(1, 2, 3)$ 到平面 $2x + y - 2z + 4 = 0$ 的距离是 _____。

3. 向量 $(1, 0, 1)$ 与 $(1, \sqrt{2}, 1)$ 的夹角是 _____。

4. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n(n+1)} x^n$ 的收敛半径是 _____。

5. 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 则 $\int_{-1}^1 f(|x|) dx =$ _____。

三、计算题 (每题 6 分,共 42 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+1}\right)^x$ 。

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt}{\sin x^3}$.

3. 求不定积分 $\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$.

4. 求过点 $(1, 0, 1)$ 且与平面 $x + y - z - 1 = 0$ 和 $2x + z + 1 = 0$ 都平行的直线的方程.

5. 求微分方程 $y'' - 4y' + 7y = 0$ 的通解.

6. 已知函数 $z = f(u, v)$ 可微, 而 $u = x \arcsin y$, $v = \frac{y}{x}$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

7. 计算二重积分 $\iint_D (2x + y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 3$, $y = x$ 与曲线 $xy = 1$ 所围成的闭区域.

四、应用题 (第 1 题 6 分, 第 2 题 8 分, 共 14 分)

1. 求由直线 $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$ 与曲线 $y = e^x$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积.

2. 设 $k > 0$, 求函数 $f(x) = \ln(1+x) + kx^2 - x$ 的极值点, 并判断是极大值点还是极小值点.

烟台大学统招专升本培训中心

五、证明题（第1题6分，第2题8分，共14分）

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(0) \neq 0$, $0 < f(1) < 1$. 证明：存在 $x_0 \in (0, 1)$ ，使得

$$f^2(x_0) = x_0.$$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明：

(1) 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$ ，使得 $f'(\xi_1) = 2\xi_1$ ；

(2) 存在 $\xi_2 \in (0, \frac{1}{2})$, $\xi_3 \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，使得 $f'(\xi_2) + f'(\xi_3) = 2(\xi_2 + \xi_3)$.



烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2021 年普通高等教育专升本统一考试 高等数学 (I) 试题答案解析

一、选择题

1. (A)

解: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{1} = 4$, 极限存在的间断点为可去间断点, 答案选 (A).

2. (D)

解: 由题意可知 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$, $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} =$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}x^2 - 0}{x} = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处左右导数存在但不相等, 答案选 (D).

3. (B)

解: 微分方程中未知函数的导数的最高阶称为微分方程的阶, 因此选项 (A)、(C) 为一阶微分方程, (D) 为三阶微分方程, (B) 为二阶微分方程, 答案选 (B).

4. (B)

解: (A) 中, $\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| < \frac{1}{n^2}$, 因为 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 根据正项级数的比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right|$ 收

敛, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛. (B) 中, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$ 满足莱布尼茨不等式, 因此收敛, 而

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$, 则根据 p 级数可知发散, 因此原级数为条件收敛. (C) 中,

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \left(-\frac{2}{3}\right)^n \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$, 因为 $\left|\frac{2}{3}\right| < 1$, 根据几何级数可知级数收敛, 因此原级数绝对收

敛. (D) 中因为 $\left| -\frac{3}{2} \right| = \frac{3}{2} > 1$, 根据几何级数可知原级数发散, 答案选 (B).

5. (C)


解: 由题意可知积分区域为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $2\cos\theta \leq \rho \leq 4\cos\theta$, 积分

区域如图所示.

化为直角坐标系下的累次积分可得

$$\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4x-x^2}} f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_0^{\sqrt{4x-x^2}} f(x, y) dy,$$

答案选 (C).



二、填空题

1. 0

解: 根据题意可知 $f(2021) = \frac{1}{2021}$, $f[f(2021)] = 0$.

2. $\frac{2}{3}$

解: 根据点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离公式

$$d = \left| \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right| \text{ 可知, } d = \left| \frac{2 \cdot 1 + 2 - 2 \cdot 3 + 4}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} \right| = \frac{2}{3}.$$

3. $\frac{\pi}{4}$

解: 根据向量的数量积可知, $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{1 \cdot 1 + 0 \cdot \sqrt{2} + 1 \cdot 1}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因此夹

角 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

4. $\frac{1}{3}$

解: $a_n = \frac{3^n}{n(n+1)}$, $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)(n+2)}}{\frac{3^n}{n(n+1)}} \right| = 3$, 则收敛半径为 $R = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{3}$.

5. 2

解: 令 $F(x) = f(|x|)$, 则 $F(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = F(x)$, 即 $f(|x|)$ 为偶函数,

因此 $\int_{-1}^1 f(|x|) dx = 2 \int_0^1 f(|x|) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx = 2$.

三、计算题

$$\begin{aligned} 1. \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+1} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x+1} \right)^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{2}} \right]^{\frac{2x}{x+1}} \\ &= e^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ 解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt}{\sin x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{3x^2 \cos x^3} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x e^{x^2}}{2x} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ 解: } \int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx &= \int \ln(1+x^2) d\left(-\frac{1}{x}\right) \\ &= -\frac{1}{x} \ln(1+x^2) + \int \frac{1}{x} \cdot \frac{2x}{1+x^2} dx \\ &= -\frac{1}{x} \ln(1+x^2) + \int \frac{2}{1+x^2} dx \\ &= -\frac{1}{x} \ln(1+x^2) + 2 \arctan x + C. \end{aligned}$$

4. 解: (解法一)

平面 $x+y-z-1=0$ 的法向量 $\vec{n}_1=(1, 1, -1)$, 平面 $2x+z+1=0$ 的法向量 $\vec{n}_2=(2, 0, 1)$.

则所求直线的方向向量

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} - 3\vec{j} - 2\vec{k}.$$

因此, 过点 $(1, 0, 1)$ 且与两平面平行的直线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-1}{-2}.$$

(解法二) 过点 $(1, 0, 1)$ 且与平面 $x+y-z-1=0$ 平行的平面方程

$(x-1)+y-(z-1)=0$, 即 $x+y-z=0$.

过点 $(1, 0, 1)$ 且与平面 $2x+z+1=0$ 平行的平面方程

$2(x-1)+(z-1)=0$, 即 $2x+z-3=0$.

所以, 所求直线方程为

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+z-3=0 \end{cases}.$$

5. 解: 微分方程 $y''-4y'+7y=0$ 的特征方程是 $\lambda^2-4\lambda+7=0$,

其特征根是 $\lambda_1=2+\sqrt{3}i$, $\lambda_2=2-\sqrt{3}i$,

则方程的通解为: $y=e^{2x}(C_1 \cos \sqrt{3}x + C_2 \sin \sqrt{3}x)$.

$$\begin{aligned} 6. \text{ 解: } \frac{\partial z}{\partial x} &= f_u \frac{\partial u}{\partial x} + f_v \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= \arcsin y \cdot f_u - \frac{y}{x^2} \cdot f_v. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= f_u \frac{\partial u}{\partial y} + f_v \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} \cdot f_u + \frac{1}{x} \cdot f_v. \end{aligned}$$

7. 解: $xy=1$, $y=3$ 和 $y=x$ 交点分别为: $(1, 1)$, $(3, 3)$ 和 $\left(\frac{1}{3}, 3\right)$,

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_D (2x+y) dx dy &= \int_1^3 dy \int_{\frac{1}{y}}^y (2x+y) dx \\ &= \int_1^3 (x^2 + xy) \Big|_{\frac{1}{y}}^y dy \\ &= \int_1^3 (2y^2 - \frac{1}{y^2} - 1) dy \\ &= \left(\frac{2}{3}y^3 + \frac{1}{y} - y \right) \Big|_1^3 = \frac{44}{3}. \end{aligned}$$

四、应用题

1. 解: 所得图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 e^{2x} dx \\ &= \frac{1}{2} \pi e^{2x} \Big|_0^2 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}\pi(e^4 - 1).$$

2. 解: 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1, +\infty)$,

$$\text{求导得 } f'(x) = \frac{2kx^2 + (2k-1)x}{1+x}.$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \text{ 得: } x_1 = 0, x_2 = -1 + \frac{1}{2k}.$$

(1) 当 $0 < k < \frac{1}{2}$ 时, $x_2 > x_1$.

x	$(-1, 0)$	0	$(0, -1 + \frac{1}{2k})$	$-1 + \frac{1}{2k}$	$(-1 + \frac{1}{2k}, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

$f(x)$ 在 $x_1 = 0$ 处取极大值, 在 $x_2 = -1 + \frac{1}{2k}$ 处取极小值.

(2) 当 $k = \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$, 函数在定义域内单调递增, 不存在极值点.

(3) 当 $k > \frac{1}{2}$ 时, $-1 < x_2 < x_1$.

x	$(-1, -1 + \frac{1}{2k})$	$-1 + \frac{1}{2k}$	$(-1 + \frac{1}{2k}, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	极大值	↘	极小值	↗

$f(x)$ 在 $x_2 = -1 + \frac{1}{2k}$ 处取极大值, 在 $x_1 = 0$ 处取极小值.

五、证明题

1. 证明: 令 $F(x) = f^2(x) - x$.

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $F(0) = f^2(0) - 0 = f^2(0) > 0$, $F(1) = f^2(1) - 1 < 0$.

由零点定理知, 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $F(x_0) = 0$, 即 $f^2(x_0) - x_0 = 0$,

所以, $f^2(x_0) = x_0$.

2. 证明: (1) 令 $F(x) = f(x) - x^2$.

已知 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $F'(x) = f'(x) - 2x$.

又因为 $F(0) = 0$, $F(1) = 0$. 由罗尔中值定理知, 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$.

即 $f'(\xi_1) = 2\xi_1$.

(2) 由拉格朗日中值定理可知:

存在 $\xi_2 \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $F(\frac{1}{2}) - F(0) = \frac{1}{2} F'(\xi_2)$,

$$\text{即 } f'(\xi_2) = 2\xi_2 + 2F(\frac{1}{2}), \quad \textcircled{1}$$

存在 $\xi_3 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $F(1) - F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} F'(\xi_3)$,

$$\text{即 } f'(\xi_3) = 2\xi_3 - 2F(\frac{1}{2}), \quad \textcircled{2}$$

由①、②式相加得

$$f'(\xi_2) + f'(\xi_3) = 2(\xi_2 + \xi_3).$$

山东省 2020 年普通高等教育专升本统一考试 高等数学 (I) 试题

本试卷分为第 I 卷和第 II 卷两部分,共 4 页。满分 100 分。考试用时 120 分钟。考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

注意事项:

1. 答题前,考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷规定的位置上,并将姓名、考生号、座号填(涂)在答题卡规定的位置。
2. 第 I 卷每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,答在本试卷上无效。
3. 第 II 卷答题必须用 0.5 毫米黑色签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应的位置;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。

第 I 卷

一、单项选择题 (每题 3 分,共 15 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将答题卡的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时,以下函数是无穷小量的是 ()。
(A) e^x (B) $\ln(x+2)$ (C) $\sin x$ (D) $\cos x$
2. 平面 $2x - 3y + 4z = 8$ 与直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{4}$ 的位置关系是 ()。
(A) 平行 (B) 垂直 (C) 相交但不垂直 (D) 直线在平面上

3. 微分方程 $y'' + 7y' - 8y = 0$ 的通解是 ()。

- (A) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{8x}$ (B) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-8x}$
(C) $y = C_1 e^x + C_2 e^{8x}$ (D) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-8x}$

4. 曲线 $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$ 的拐点是 ()。

- (A) $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ (C) $(-1, 0)$ (D) $(0, -1)$

5. 以下级数收敛的是 ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+1}{n^3+2n^2}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{n\pi}{3}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n+1}$

第 II 卷

二、填空题 (每题 3 分,共 15 分)

1. 函数 $f(x) = \sqrt{\frac{x}{3}} - 1$ 的定义域是_____。
2. 曲线 $y = \frac{1}{x} + 2\ln x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线的方程是_____。
3. 若 $\int_a^b f(x)dx = 1$, $\int_a^b [2f(x) + 3g(x)]dx = 8$, 则 $\int_a^b g(x)dx =$ _____。
4. 已知两点 $A(-1, 2, 0)$ 和 $B(2, -3, \sqrt{2})$, 则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量是_____。
5. 已知函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 设 $I = \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y)dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y)dy$, 则交换积分次序后 $I =$ _____。

三、计算题 (第 1~7 题每题 6 分,第 8 题 7 分,共 49 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + x + 2} - x \right)$ 。

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3}$.

3. 求不定积分 $\int \frac{\sqrt{x} + \ln x}{x} dx$.

4. 求过点 $(1, -2, 2)$ 且与两平面 $x + 2y - z = 1$ 和 $2x + y + 3z = 2$ 都垂直的平面方程.

5. 已知函数 $z = x \sin \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6. 计算二重积分 $\iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, $y = \sqrt{3}x$ 与圆周 $x^2 + y^2 = \frac{\pi}{2}$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

7. 求微分方程 $y' + y = e^x + x$ 的通解.

8. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1}$ 的收敛域及和函数.

四、应用题 (每题 7 分, 共 7 分)

1. 求曲线 $y = -x^2 + 4$ 与直线 $y = -2x + 4$ 所围成的图形的面积.

烟台大学统招专升本培训中心

五、证明题（每题 7 分，共 14 分）

1. 证明：当 $x > 1$ 时， $x + \ln x > 4\sqrt{x} - 3$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(1) = 1$. 证明：对于任意实数 $\lambda \in (0, 1)$ ，存在

$\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = \frac{\lambda}{\xi^2}$.



烟台大学统招专升本培训中心

山东省 2020 年普通高等教育专升本统一考试 高等数学 (I) 试题答案解析

一、单项选择题

1. (C)

解: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 是无穷小量. 因为

$\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x+2) = \ln 2$, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$, 答案选 (C).

2. (B)

解: 平面 $2x - 3y + 4z = 8$ 的法向量为 $\vec{n} = (2, -3, 4)$, 直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{4}$ 的方向向量

为 $\vec{a} = (2, -3, 4)$, 显然 $\vec{n} \parallel \vec{a}$, 因此平面与直线垂直, 答案选 (B).

3. (D)

解: 微分方程的特征方程为 $r^2 + 7r - 8 = 0$, 解得 $r_1 = -8$, $r_2 = 1$, 显然特征方程存在两个不同的实根, 根据微分方程的通解公式可知方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-8x}$, 答案选 (D).

4. (A)

解: $y' = 6x^2 + 6x$, $y'' = 12x + 6$, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, $y'' = 0$. 又当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $y'' < 0$, 函数为

凸函数; 当 $x > -\frac{1}{2}$ 时, $y'' > 0$, 函数为凹函数, 因此当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 函数取得拐点

$(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, 答案选 (A).

5. (C)

解: 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2+1}{n^3+2n^2}}{\frac{1}{n}} = 1$, 根据正项级数比较法的极限形式可知, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n^3+2n^2}$ 的敛散性与

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ 相同, 因此 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n^3+2n^2}$ 发散. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{n\pi}{3} \neq 0$, 根据级数收敛的必要条件可知,

$\sum_{n=1}^{+\infty} \sin \frac{n\pi}{3}$ 发散. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln(1 + \frac{1}{n^2}) \sim \frac{1}{n^2}$, 根据正项级数比较法的极限形式可知

$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$ 的敛散性与 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ 相同, 所以 $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + \frac{1}{n^2})$ 收敛. 由于

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{2^{n+1}+1}}{\frac{3^n}{2^n+1}} = \frac{3}{2} > 1$, 根据正项级数比值判别法可知级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n}{2^n+1}$ 发散.

答案选 (C).

二、填空题

1. $[3, +\infty)$

解: 由题意可知, 函数的定义域满足 $\frac{x}{3} - 1 \geq 0$, 解得 $x \geq 3$,

因此函数的定义域为 $[3, +\infty)$.

2. $y = x$

解: $y'(1) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} \Big|_{x=1} = 1$, 则切线方程为 $y - 1 = 1 \cdot (x - 1)$, 整理得 $y = x$.

3. 2

解: 由题意可知, $\int_a^b [2f(x) + 3g(x)] dx = 2 \int_a^b f(x) dx + 3 \int_a^b g(x) dx = 8$, 又因为

$\int_a^b f(x) dx = 1$, 因此 $\int_a^b g(x) dx = 2$.

4. $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6})$

解: $\vec{AB} = (2 - (-1), -3 - 2, \sqrt{2} - 0) = (3, -5, \sqrt{2})$, 则


$|\vec{AB}| = \sqrt{3^2 + (-5)^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{36} = 6$, 则单位向量为

$\vec{e} = \frac{1}{6}(3, -5, \sqrt{2}) = (\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6})$.

5. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^{2-y} f(x, y) dx$

解: 积分区域如图所示, 转化成 Y 型区域为

$\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ y^2 < x < 2-y \end{cases}$, 因此交换累次积分顺序之后为



$$\int_0^1 dy \int_{y^2}^{2-y} f(x, y) dx.$$

三、计算题

$$\begin{aligned} 1. \text{解: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3 + 3x^2}{x^2 + x + 2} - x \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 2x}{x^3 + x + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} = 2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{解: } \int \frac{\sqrt{x} + \ln x}{x} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{\ln x}{x} dx \\ &= 2\sqrt{x} + \int \ln x d(\ln x) \\ &= 2\sqrt{x} + \frac{1}{2} \ln^2 x + C. \end{aligned}$$

4. 解: 由已知, 两个平面的法向量分别为所求平面的法向量为:

$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 7\vec{i} - 5\vec{j} - 3\vec{k}.$$

$$\text{即 } \vec{n} = (7, -5, -3)$$

又平面过点 $(1, -2, 2)$

得平面的方程为: $7(x-1) - 5(y+2) - 3(z-2) = 0$

化简为: $7x - 5y - 3z - 11 = 0$.

$$\begin{aligned} 5. \text{解: } \frac{\partial z}{\partial x} &= \sin \frac{y}{x} + x \cdot \left(-\frac{y}{x^2} \right) \cos \frac{y}{x} \\ &= \sin \frac{y}{x} - \frac{y}{x} \cos \frac{y}{x}, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{x} \sin \frac{y}{x}$$

$$= \frac{y}{x^2} \sin \frac{y}{x}.$$

6. 解: 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$

则 D 在极坐标系下化为: $0 \leq r \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}$, $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$

$$\begin{aligned} \text{因此, } \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} r \cos r^2 dr \\ &= \frac{\pi}{6} \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} r \cos r^2 dr \\ &= \frac{\pi}{12} \sin r^2 \Big|_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \frac{\pi}{12}. \end{aligned}$$

7. 解: 此方程为一阶非齐次线性微分方程, 其中 $P(x) = 1$, $Q(x) = e^x + x$

$$\begin{aligned} \text{由公式得通解为: } y &= e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\int dx} \left[\int (e^x + x) e^{\int dx} dx + C \right] \\ &= e^{-x} \left[\int (e^x + x) e^x dx + C \right] \\ &= e^{-x} \left(\int e^{2x} dx + \int x e^x dx + C \right) \\ &= e^{-x} \left(\frac{1}{2} e^{2x} + x e^x - e^x + C \right) \\ &= \frac{1}{2} e^x + x - 1 + C e^{-x}, C \in \mathbf{R}. \end{aligned}$$

8. 解: 记 $a_n = \frac{1}{n+1}$, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$,

故收敛半径是 $R = 1$, 收敛区间是 $(-1, 1)$.

又因为当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散,

当 $n = -1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛,

所以收敛域为 $[-1, 1)$.

设 $S = (x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1}$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$, $x \in (-1, 1]$.

则 $S(x) = xg(x)$.

当 $x \in (-1, 1)$ 时, $g'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$,

则 $g(x) = \int_0^x g'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x)$, $x \in [-1, 1)$.

从而 $S(x) = xg(x) = -x\ln(1-x)$, $x \in [-1, 1)$.

四、应用题

1. 解: 由 $\begin{cases} y = -x^2 + 4 \\ y = -2x + 4 \end{cases}$ 得交点为 $(0, 4)$, $(2, 0)$.

所求的图形的面积为:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 [(-x^2 + 4) - (-2x + 4)] dx \\ &= \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx \\ &= \left(-\frac{1}{3}x^3 + x^2 \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

五、证明题

1. 证明: 令 $f(x) = x + \ln x - 4\sqrt{x} + 3$, $x \in [1, +\infty)$.

则 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可导, 且当 $x \in (1, +\infty)$ 时,

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{\sqrt{x}} = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 > 0.$$

所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增.

从而当 $x > 1$ 时, 有 $f(x) > f(1) = 0$,

即 $x + \ln x > 4\sqrt{x} - 3$.

2. 证明: 对于任意的实数 $\lambda \in (0, 1)$, 令 $F(x) = x^2 f(x) - \lambda$, $x \in [0, 1]$.

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,

且 $F(0) = -\lambda < 0$, $F(1) = f(1) - \lambda = 1 - \lambda > 0$,

则由连续函数的零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi) = 0$,

即 $\xi^2 f(\xi) - \lambda = 0$, 从而 $f(\xi) = \frac{\lambda}{\xi^2}$.